

掃描此QR code可獲取前往本中心的路線。



## 如何前往

### 港鐵

1. 從港鐵中環站K出口，穿過匯豐總行大廈，橫過斑馬線到長江集團中心側，沿扶手電梯上花園道，經行人天橋到達花旗銀行大廈。
2. 從港鐵中環站J2出口，穿過遮打花園，橫過斑馬線到長江集團中心，沿花園道直上，乘扶手電梯到行人天橋，直往花旗銀行大廈。

### 的士

的士上落處位於花旗銀行大廈平台入口。

本中心專用升降機位於大堂客戶服務處旁。

## 關於香港綜合影像及內視鏡診斷中心

香港綜合影像及內視鏡診斷中心提供多元化的篩查、內視鏡檢查、影像診斷和介入放射治療等服務。本中心的主要診斷服務及醫療設施包括正電子放射斷層掃描(PET-CT)、磁力共振掃描(MRI)、三結合正電子電腦斷層掃描磁力共振掃描(PET/CT-MRI)、電腦斷層掃描(CT)、介入放射治療及數碼減影血管造影、3D乳房X光造影、超聲波檢查、X光檢查、DEXA骨質密度檢查、食道、胃及大腸內視鏡及血液檢查等。



## 聯絡我們



香港綜合影像及內視鏡診斷中心  
HONG KONG INTEGRATED  
Imaging & Endoscopy Diagnostic Centre

香港中環花園道3號花旗銀行大廈3樓全層  
3/F., Citibank Tower, 3 Garden Road,  
Central, Hong Kong

☎ 3700 6800 / 3700 6801

☎ +852 6639 9300

💻 www.hkiedc.com.hk

Branch of Kong Kong Integrated Oncology Centre



香港綜合影像及內視鏡診斷中心  
HONG KONG INTEGRATED  
Imaging & Endoscopy Diagnostic Centre



上消化道(食道、  
胃及十二指腸)  
內視鏡檢查服務

## 簡介

- 上消化道內視鏡檢查(俗稱胃鏡)是利用一條柔軟可彎曲的光導纖維內視鏡(直徑約1厘米)。由口腔進入食道、胃及十二指腸，以作檢查或即時治療。
- 內視鏡能清楚、準確作出各項檢查及治療。例如切除瘻肉、止血及抽取胃或食道組織作病理化驗及幽門螺旋菌測試，以便根治由幽門螺旋菌引起的胃潰瘍及預防胃和食道癌。
- 本中心採用先進的內視鏡設備 — Olympus (奧林巴斯) EVIS LUCERA ELITE 190系列內視鏡，所有內視鏡均配有微距，窄頻光學及全高清鏡頭，可增加檢查的準確性及早期瘻肉的診斷率。

## 接受上消化道內視鏡之原因 (建議先與醫生討論)

- 上消化道出血(大便帶黑色或血)
- 原因不明之貧血現象
- 上腹痛
- 胃酸倒流或胸口灼熱
- 持續嘔吐，食慾不振
- 吞嚥困難

## 檢查前準備

1. 病人經醫生解釋檢查過程後簽署同意書。
2. 病人需於6小時前開始禁食。
3. 檢查前病人需要除去假牙、眼鏡、隱形眼鏡、飾物或其他金屬物品。
4. 女士須注意經期日期，確保沒有懷孕。
5. 如有藥物敏感、糖尿病、心臟病、高血壓、其他慢性病或服用抗血小板、薄血丸及抗凝血藥物等都必須告知醫生、查詢檢查前停服時間。

## 檢查過程

1. 檢查進行時，病人需向左側臥。
2. 醫護人員會為病人放置打靜脈針管，以注射鎮靜劑和止痛劑，令病人舒適地接受檢查。
3. 醫護人員會在病人喉部噴上局部麻醉藥，然後替病人帶上膠牙墊。
4. 檢查期間醫護人員會密切監察病人之心肺功能。
5. 如在檢查中發現有胃出血或瘻肉的情況，醫生會即時進行適當治療。
6. 檢查過程約15分鐘。

## 風險或併發症

- 鎮靜劑引起之副作用，例如：血壓低、呼吸困難、休克或過敏等。
- 檢查期間病人可能感嘔心、輕度喉嚨痛楚或上腹脹。
- 上消化道損傷或出血，但發生機會很微。

## 檢查後須知

- 待吞嚥知覺恢復後(約1小時)，請詢問醫護人員方可進食。
- 病人在檢查當天應避免操作機器或駕駛，簽署法律文件及飲酒，並應由一位成人陪同離開。
- 若感到腹部劇痛、出現大便出血或變黑、發燒等情況，請即通知負責醫生或求診。
- 當黑色暴雨警告或8至10號風球懸掛時，預約日期將取消，請致電診所再作預約。